



Office of Developmental Primary Care

Improving health outcomes for people with Developmental disabilities

評估行為改變

有溝通障礙的人，其病情的典型，是出現行為或功能的改變。行為可以是溝通的一種形式。有行為障礙的人，通常可給有關他們健康的重要資料。他們可能需要像視覺、選擇或接進輔助性和另類溝通的支援。任何有行為或功能改變的病人，應接受醫療評估。

HURTS助記符提供一個對傷健者行為改變最常見之醫療導因的鑒別診斷。

Head (頭)，包括頸椎、偏頭痛、聽覺、視覺，牙齒和頸受傷

Urinary tract (尿道)，腎石、尿道感染和梗阻

Reflux (回流) 和腸胃問題

Thyroid (甲狀腺) 和外傷

Seizures (癲癇和藥物副作用)，癲癇可以注意力不集中、行為抽搐和情緒不穩展示

行為改變亦可以表示：

- 虐待或其他壓力
- 逃避或避免要求
- 增加興奮或意欲
- 接進選擇活動或物件之方法
- 心理病
- 需要社交注意
- 追尋權力和控制
- 減少引起焦慮的興奮
- 感覺問題：視覺，聽覺或感覺整合
- 濫用化學藥物
- 無法知道的痛或不適

參考

1. Zelenski, SG. Evaluation for and use of psychopharmacologic treatment in crisis intervention for people with mental retardation and mental illness. In: Hanson R, Wieseler K, Lakin C, Braddock DL, eds. *Crisis: Prevention & Response in the Community*. Washington, DC: American Association on Mental Retardation; 2002:243-256.

EVALUATION OF BEHAVIOR CHANGE